

## Gebrauchsanweisung


Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, denn sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Produkts beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

# **neo-angin<sup>®</sup>** **junior** HALSSCHMERZSAFT

## Medizinprodukt

### Zusammensetzung:



Isländisch Moos-Extrakt; Malvenblüten-Extrakt; Zinkgluconat, Kaliumsorbat, Hustenkräuter-Aroma, Kirsch-Aroma, Maltitol-Lösung

Das Produkt ist alkohol- und zuckerfrei sowie frei von künstlichen Farbstoffen, Laktose und Gluten.

### Hinweis für Diabetiker:


Der **neo-angin<sup>®</sup> junior Halsschmerzsaft** enthält Maltitol. Eine Einzeldosis von 10 ml enthält 0,52 BE

### Darreichungsform und Inhalt:

100 ml Sirup zum Einnehmen

### Anwendungsgebiete:

Der **neo-angin<sup>®</sup> junior Halsschmerzsaft** wird bei Schleimhautreizungen im Mund- und Rachenraum, z.B. in Folge von Erkältungskrankheiten oder Halsschmerzen, angewendet.



### Hinweis für die Anwendung:

Kinder ab 1 Jahr nehmen je nach Bedarf 1- bis 2-mal täglich 5 ml ein.

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren nehmen 2-mal täglich 10 ml ein.

Bitte benutzen Sie für eine genaue Dosierung den beigegefügt Messbecher.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Bestehen die Beschwerden länger als 2-3 Tage, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe wenden Sie den **neo-angin<sup>®</sup> junior Halsschmerzsaft** bitte nicht an.

### Schwangerschaft und Stillzeit:

Zur Anwendung dieses Medizinproduktes während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Daher sollte die Anwendung von **neo-angin<sup>®</sup> junior Halsschmerzsaft** in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker erfolgen.

### Überdosierungshinweis:

Der **neo-angin® junior Halsschmerzsaft** enthält Süßungsmittel. Sie können bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Bitte den **neo-angin® junior Halsschmerzsaft** trocken und nicht über 25°C lagern.

**Hinweis zur Aufbewahrung: Achtung!** Das Medizinprodukt ist nach Anbruch der Flasche nicht länger als 14 Tage verwendbar!

**Bitte bewahren Sie das Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf!**

**Stand der Information:** März 2015

PZN: 10417563

### Medizinprodukt



MPC International S. A.  
26, Boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg

 **Vertrieb:** MCM Klosterfrau, D-50606 Köln

Der **neo-angin® junior Halsschmerzsaft** wurde speziell zur Anwendung bei Kindern und Kleinkindern entwickelt, um die Erstickungsgefahr durch ein versehentliches Verschlucken von Lutschtabletten zu vermeiden. Durch die Darreichungsform eignet er sich auch sehr gut zur Einnahme kurz vor dem Zubettgehen.

Der wohlschmeckende und fruchtige Geschmack ist bei Kindern sehr beliebt.

### Wirkweise:

Unsere Atemluft ist gerade in den kühlen Wintermonaten mit Krankheitserregern belastet. Eine gesunde Schleimhaut kann die schädlichen Eindringlinge normalerweise problemlos abwehren. Wenn die Schleimhaut allerdings gereizt und ausgetrocknet und damit geschwächt ist, haben Erreger wie Bakterien und Viren ein leichtes Spiel und können ungehindert eindringen.

Der **neo-angin® junior Halsschmerzsaft** bildet durch seine Inhaltsstoffe einen besonderen Schutzfilm, der sich auf die gereizte Schleimhaut in Mund und Rachen legt und diese so beruhigt und gleichzeitig weitere Reizungen abwehrt. Die Schleimhaut kann sich schneller erholen und ihre ursprüngliche Funktion wieder erfüllen.

---

**Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klosterfrau-Kundenbetreuung:**

Tel.: 0800/16 52-100

Fax: 0800/16 52-700

E-Mail: [dialog@klosterfrau-service.de](mailto:dialog@klosterfrau-service.de)

Internet: [www.neo-angin.de](http://www.neo-angin.de)

 **LOT** Chargenbezeichnung



Hersteller



Verwendbar bis



25°C  
Obere Temperaturbegrenzung 25 °C



Packungsbeilage beachten!

32 010 887

03P0318

151746D